

Wilmer Zanghirati Urbanaz

**OLIGOTERAPIA
CATALITICA
E DIATESICA**




**DALLO STUDIO
DELLA PERSONA
ALLA CURA
DEL SUO TERRENO**



« É più importante sapere che tipo di persona ha una malattia che non sapere che tipo di malattia ha una persona»

Ippocrate




Wilmer Zanghirati Urbanaz

**OLIGOTERAPIA
CATALITICA
E DIATESICA**



LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA





OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO

Le ricerche sistematiche e le osservazioni cliniche del Dott. Ménétrier e dei suoi collaboratori hanno loro permesso di trarre le seguenti conclusioni.

OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO

1)-Esistono delle diatesi, o “terreni morbidi”, che raggruppano, ciascuno, un certo numero di sintomi e di predisposizioni morbose.

OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO

2)-Queste diatesi costituiscono un'entità eziologica dalla quale si ha la prova, attraverso l'azione pluri-sintomatica di un oligoelemento o di un gruppo di oligo-elementi sulla diatesi stessa.

OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO

3)-Un apporto di oligo-elementi é specifico di una diatesi e non di un sintomo, esso permette di modificare l'insieme delle perturbazioni constatate su di un terreno.

OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO

4)-L'azione degli oligo-elementi é regolatrice, equilibrante, adattativa e si applica all'insieme del caso con i suoi elementi psichici e fisiologici.

OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO

**5)-Le quantità attive di oligo-elementi sono dell'ordine del:
centomillesimo / milionesimo
di grammo.**


OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO

6)-Se il metodo non comporta alcuna tossicità, nel corso delle somministrazioni, si osservano, frequentemente, dei fenomeni di riattivazione momentanea dei processi allergici.

OLIGO-ELEMENTI E TERRENO DIATESICO

7)-Un tempo si riteneva vantaggioso unire l'opoterapia con l'oligoterapia. Questi due metodi agiscono, indiscutibilmente, in sinergia.


LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA






« È più importante sapere che tipo di persona ha una malattia che non sapere che tipo di malattia ha una persona »


Ippocrate











Ectomorph



Endomorph



Mesomorph



Temperament sanguini



Temperament Biliós



Temperament nerviós



Temperament limfàtic



SANGUINI



COLERICI





NERVOSI



LINFATICI

LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA






Brevilineo stenico

Sanguigno

Sulfurico

Mesoblasta



Normolineo stenico/Longilineo astenico


Nervoso

Fosforico

Ectoblasta

Malinconico

Fluorico



Longilineo stenico

Bilioso

Muriatico

Cordoblasta




Brevilineo astenico

Flegmatico

Carbonico

Endoblasta

LE DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E LE COSTITUZIONI SECONDO IL MODELLO EMBRIOLOGICO



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

I DIATESI

IPER-REATTIVA

allergica

artritico-allergica

Oligoelemento:

MANGANESE

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

I DIATESI

IPER-REATTIVA

Oligoelemento:
MANGANESE

Reattività agli stimoli esterni:
IPER-REATTIVITÀ

Giornata:
IN SALITA
(PEGGIO IL MATTINO)

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

I DIATESI

IPER-REATTIVA

Oligoelemento: MANGANESE

ASPETTI COSTITUZIONALI PREVALENTI

Medicina omeopatica:

Fluorica, Fosforica, Sulfurica, Muriatica

Costituzionale sec. Ippocrate

Malinconica, Nervosa, Sanguigna, Biliosa

Embriologica sec. Martiny:

Ectoblasta, Mesoblasta, Cordoblasta



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

É la diatesi degli adolescenti e degli adulti giovani; é una diatesi ribelle.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

Verso i 25-30 anni di età, talvolta verso la cinquantina, le persone di questa diatesi evolvono, generalmente, verso la diatesi dis-reattiva (**MANGANESE-COBALTO**).

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

Sebbene in questa diatesi si trovino degli aspetti funzionali importanti (sintomi e predisposizioni morbose),

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA ***DIATESI IPER-REATTIVA***

essa resta l'espressione di una giovinezza relativa e di una difesa contro la degenerazione e le lesioni.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

Se la diatesi iper-reattiva è l'espressione di una vitalità e di una giovinezza fisiologica, essa si può mantenere anche fino ad un'età avanzata.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA ***DIATESI IPER-REATTIVA***

In questo caso, essa si può, talvolta, trasformare, bruscamente, in a-reattiva funzionale, cioè, la diatesi IV (RAME-ORO-ARGENTO).

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

L'iper-reattivo é di natura attiva, stenica, dinamica, energica, volitiva ed ostinata, impetuosa ed irruente, esaltata, con un grande bisogno di attività e di azione e molto spirito d'iniziativa.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

L'individuo iper-reattivo é portato ad essere ottimista ed ha una grande fiducia in se stesso.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

Può essere un collerico: se non arriva a superare l'ostacolo, egli se la prende e se ne dispiace.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

Può essere un collerico: se non arriva a superare l'ostacolo, egli se la prende e se ne dispiace.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

É, ancora, una persona obiettiva, con spirito aperto, con una grande capacità di adattamento e, soprattutto, una grande costanza nei sentimenti.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

Sul piano dell'astenia, é stanco il mattino, spesso la sua stanchezza scompare con lo sforzo;

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

in altri termini soffre nel levarsi dal letto, ma una volta in attività, va, decisamente, meglio.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

Per contro, l'iper-reattivo, di sera é iper-reattivo fino ad arrivare anche all'insonnia.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

Anche sotto l'aspetto dell'attività muscolare é "iper".

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

a) Il comportamento

Morfologicamente, non é improbabile incontrare soggetti iper-reattivi che presentino: un organismo robusto, rettangolare; mani quadrate; carnagione olivastra e bruna; con pelle calda e secca.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

b) Il sonno

L'iper-reattività serotina é tale da arrivare anche all'euforia, sovente vi può essere difficoltà a prendere sonno, o meglio, vi può essere difficoltà a convincersi che é ora di dormire.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

b) Il sonno

Il sonno dell'iper-reattivo può essere, anche, irregolare, ma é, comunque, ristoratore.


OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

b) Il sonno

Il risveglio mattutino dell'iper-reattivo può essere "laborioso", una sensazione di stanchezza può accompagnare il risveglio e l'eventuale sensazione di stanchezza può scomparire con l'inizio dell'attività e dello sforzo fisico.

APPROCCIO OLIGOTERAPICO ALL'INSONNIA



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e gli aspetti predisponenti

- allergie esogene:**
- orticaria, eczema, prurito e situazioni asmatiche, rinofaringiti;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
DIATESI IPER-REATTIVA

**c) I sintomi e gli aspetti predisponenti
problemi a carico dell'apparato
respiratorio superiore; rinite, corizza
spasmodica e "raffreddore da fieno";**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

- c) I sintomi e gli aspetti predisponenti**
- intolleranze ai cibi di tipo allergico;**
 - allergie ad elementi chimici;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

- c) I sintomi e gli aspetti predisponenti**
- cefalee o emicranie periodiche, alle tempie, orbitarie o retro-orbitarie, fotofobia, fonofobia;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e gli aspetti predisponenti

- tic nervosi**

(iper-eccitabilità neuromuscolare);

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

- c) I sintomi e gli aspetti predisponenti**
- leggere cardiopatie nervose**
 - tachicardie e palpitazioni**
 - precordialgie, extrasistoli, ecc.;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

- c) I sintomi e gli aspetti predisponenti**
- tendenza a brusche variazioni della pressione arteriosa, iper- o ipotensione e vertigini;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

- c) I sintomi e gli aspetti predisponenti
- turbe digestive ed intestinali (somatizzazioni), nausea, vomito, rallentato svuotamento;

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

- c) I sintomi e gli aspetti predisponenti**
- lieve insufficienza epatica ed epatopatie; turbe a carico della cistifellea (ittero), coliche biliari, calcoli biliari;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

Contrariamente alla diatesi II (ipo-reattiva), é, piuttosto, un tipo "iper" che non un tipo "ipo", per cui può presentare anche:

- tendenza funzionale all'iper-tiroidismo;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

Contrariamente alla diatesi II (ipo-reattiva), é, piuttosto, un tipo "iper" che non un tipo "ipo", per cui può presentare anche:

- dismenorrea di tipo "iper", con flusso abbondante;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

Contrariamente alla diatesi II (ipo-reattiva), é, piuttosto, un tipo "iper" che non un tipo "ipo", per cui può presentare anche:

- mestruazioni ravvicinate;

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

Contrariamente alla diatesi II (ipo-reattiva), é, piuttosto, un tipo "iper" che non un tipo "ipo", per cui può presentare anche:

- iper-genitalismo (soprattutto per i soggetti di costituzione mesoblasta);**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

Contrariamente alla diatesi II (ipo-reattiva), é, piuttosto, un tipo "iper" che non un tipo "ipo", per cui può presentare anche:

- iper-surrenalismo (soprattutto per i soggetti di costituzione mesoblasta).**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

Il terreno iper-reattivo si trova, frequentemente, sui soggetti "civilizzati" e sembra avere una relazione diretta con le condizioni di auto-intossicazione della vita odierna.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

**c) I sintomi e le predisposizioni
morbose**

**Tra i soggetti iper-reattivi ritroviamo
anche le persone "malaticce" che
vivono nei centri urbani ed
intelletuali.**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

**c) I sintomi e le predisposizioni
morbose**

**Il lato aggressivo delle manifestazioni
é caratteristico di questa diatesi.**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

Se può capitare di trovarsi nello stato più acuto della riacutizzazione e delle intolleranze, può, pure, accadere, talvolta, di trovarsi, anche, in presenza di guarigioni spettacolari.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento oligoterapico
É probabile ritrovare, tra la sintomatologia e le predisposizioni morbose, degli antecedenti nella storia familiare, come eczema, asma, emicrania, orticaria, allergie in generale e, soprattutto, nel comportamento psicosomatico.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento oligoterapico l'oligoelemento **MANGANESE** corregge la sintomatologia, le predisposizioni morbose e gli aspetti comportamentali che caratterizzano gli individui appartenenti a questa diatesi.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento oligoterapico
É utile, spesso, associare,
all'oligoelemento **MANGANESE**,
l'elemento **ZOLFO**, per coloro che
presentano deficit funzionali epatici.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento oligoterapico
Mentre, **IODIO**, é da associare in presenza di turbe della tiroide.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento oligoterapico

Nel caso di una riacutizzazione della sintomatologia, fatto che può accadere in questa diatesi, é utile sospendere tale trattamento per almeno una settimana;

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPER-REATTIVA

e) L'evoluzione diatesica

L'iper-reattivo tende ad evolvere, naturalmente, verso la dis-reattività; tende ad evolvere, accidentalmente, verso l'a-reattività.


OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA


DIATESI IPER-REATTIVA

e) L'evoluzione diatesica

Il soggetto iper-reattivo, qualora non venga sostenuto per tempo, tenderà all'asma cronica, all'eczema cronico, alle forme artrosiche, all'iper-tensione essenziale, all'iper-tiroidismo ed alle litiasi biliare e renale.

LE DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E LE COSTITUZIONI SECONDO IL MODELLO EMBRIOLOGICO






Brevilineo stenico

Sanguigno

Sulfurico

Mesoblasta



Normolineo stenico/Longilineo astenico


Nervoso

Malinconico

Fosforico

Fluorico

Ectoblasta



Longilineo stenico

Bilioso

Muriatico

Cordoblasta




Brevilineo astenico

Flegmatico

Carbonico

Endoblasta

LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

II DIATESI

IPO-REATTIVA

ipostenica

ipostenico-infettiva

linfatico-ipostenica

Oligoelementi:

MANGANESE-RAME

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

II DIATESI

IPO-REATTIVA

Oligoelementi:
MANGANESE-RAME

Reattività agli stimoli esterni:
IPO-REATTIVITÀ

Giornata:
IN DISCESA
(PEGGIO LA SERA)

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

II DIATESI

IPO-REATTIVA

Oligoelementi: MANGANESE-RAME

ASPETTI COSTITUZIONALI PREVALENTI

Medicina omeopatica:

Carbonica

Costituzionale sec. Ippocrate:

Flegmatica

Embriologica sec. Martiny:

Endoblasta



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

É la diatesi nella quale si riconoscono la maggioranza dei malati a carattere esogeno, specialmente coloro che sono, frequentemente, affetti da malattie microbiche e da virus.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

É una diatesi che si trova, tanto nel bambino, come nell'adolescente e nell'uomo di età adulta.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

Se questa diatesi non é "caduta" nel patologico, essa ha la tendenza, con il passare dell'età, a portare ad un certo equilibrio.


OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

La diatesi ipo-reattiva evolve molto raramente verso l'anergia brutale, cioè la diatesi IV (a-reattiva).

Non come può avvenire nella diatesi I (iper-reattiva).

LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

L'ipo-reattivo é una natura calma, riflessiva, ponderata, ordinata, metodica ed equilibrata, anche se, psichicamente, può presentare una certa fragilità.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

L'ipo-reattivo é una persona, generalmente, pessimista, apparentemente introversa ed indifferente, che può dare l'impressione di non potersi appassionare, ed ancor meno esaltare, per qualsiasi cosa.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

L'ipo-reattivo, intellettualmente, ha delle difficoltà a concentrarsi, ad essere attento durante le ore di scuola; e può essere distratto, disattento e dislessico.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

L'ipo-reattivo può sembrare indifferente e noncurante, metodico, é portato ad avere molto "self-control"; é un economo nello spendere le sue energie: il suo motto sembra essere "il massimo rendimento con il minimo sforzo".

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

Contrariamente al soggetto di diatesi iper-reattiva, l'ipo-reattivo ha la propensione a saper distinguere l'attività dall'agitazione; tende a parlare poco ed esclusivamente delle cose che lo interessano.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

Nei sentimenti, l'ipo-reattivo é il tipo che, sovente, si muove per interesse; é una forza lenta, passiva ma continua.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

L'ipo-reattivo sembra più essere dotato di una conoscenza profonda della materia, che non di un'intelligenza brillante.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

L'ipo-reattivo é di natura "stancabile", tale da poter presentare una deficienza di resistenza fisica e un'astenia, man mano crescente, con il passare della giornata o con lo sforzo.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

Questa sua astenia tende a diminuire, fino a scomparire, nei momenti di rilassamento e durante i momenti di "pubbliche relazioni".

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento


Per l'ipo-reattivo sono assolutamente necessari, le vacanze ed i momenti di riposo.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

a) Il comportamento

Morfologicamente, é molto probabile incontrare soggetti ipo-reattivi che presentino: viso rotondo, oppure ovale, mani piccole, pelle fine, bianca e fredda, corpo "tondeggiante", più largo al bacino e, talvolta, un'obesità di tipo "molle".




Brevilineo stenico

Sanguigno

Sulfurico

Mesoblasta



Normolineo stenico/Longilineo astenico


Nervoso

Malinconico

Fosforico

Fluorico

Ectoblasta



Longilineo stenico

Bilioso

Muriatico

Cordoblasta



Brevilineo astenico

Flegmatico

Carbonico

Endoblasta

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

b) Il sonno l'ipo-reattività può portare ad un'astenia, man mano, crescente con il passare della giornata, il bisogno di sonno é, sovente, una necessità, mentre si può ridurre durante i momenti di “pubbliche relazioni”.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA


DIATESI IPO-REATTIVA

b) Il sonno


Il sonno dell'ipo-reattivo é, generalmente, ristoratore.

Il risveglio mattutino dell'ipo-reattivo avviene, di regola, senza sforzo e di buon'ora.

APPROCCIO OLIGOTERAPICO ALL'INSONNIA



LE DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E LE COSTITUZIONI SECONDO IL MODELLO EMBRIOLOGICO



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

fragilità delle vie respiratorie e delle sierose, legata a fattori infettivi;

- riniti recidivanti, angine, tonsilliti e otiti recidivanti, faringiti, laringiti, tracheiti, bronchiti, pleuriti; nonché cistiti;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

fragilità delle vie respiratorie e delle sierose, legata a fattori infettivi;

- sistema reticolo-endoteliale "sregolato";**
- reazioni linfatiche e digestive (soprattutto di tipo infettivo), linfadeniti;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

- **turbe digestive ipo-secretive, a prevalenza duodenale (predisposizione a duodeniti ed ulcera duodenale), digestione rallentata, meteorismo e flatulenza;**
- **enterocoliti, e coliti sx;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

- ipo-funzione epato-pancreatica, atonia gastro-intestinale;**
- turbe della nutrizione;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

- allergie endogene (orticaria, eczema ed acne) con tendenza all'infezione;**
- cefalee;**
- anemie e leucopenie;**
- ritardi nello sviluppo;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

- forme artrosiche, diabete, obesità e cellulite;**
- turbe artrotubercolari ed infiammatorie;**
- forme artritiche (progressivamente deformanti ed anchilosanti);**
- lassità legamentosa;**
- enuresi;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

e numerose "disfunzioni", generalmente poco gravi ma persistenti come:

- asma bronchiale, asma cronico misto (allergico e bronchite asmatica), enfisema e bronchiectasie;**
- "turbe" nell'eliminazione;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

Contrariamente alla diatesi I (iper-reattiva), é, piuttosto, un tipo "ipo" che non un tipo "iper", per cui può presentare anche:

- tendenza funzionale all'ipotiroidismo;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

Contrariamente alla diatesi I (iper-reattiva), é, piuttosto, un tipo "ipo" che non un tipo "iper", per cui può presentare anche:

- dismenorrea di tipo "ipo", con flusso scarso;**
- mestruazioni distanziate;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

Contrariamente alla diatesi I (iper-reattiva), é, piuttosto, un tipo "ipo" che non un tipo "iper", per cui può presentare anche:

- ipo-genitalismo;
- ipo-surrenalismo.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

Gli antecedenti famigliari sono meno marcati rispetto alla diatesi iper-reattiva e si riconoscono, soprattutto, nei sintomi funzionali, come la fragilità respiratoria ed il comportamento ipo-reattivo.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento oligoterapico

L'associazione oligoterapica

MANGANESE-RAME migliora

notevolmente tutte le manifestazioni del comportamento e degli stati funzionali di questa diatesi,

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento oligoterapico la loro azione si completa con quella dell'elemento **ZOLFO**, dello **IODIO**, e, talvolta con quella dell'elemento **POTASSIO**.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento oligoterapico **MANGANESE-RAME**, in questi casi, "rinforza" ogni terapia; é l'esempio di una terapia del terreno e l'applicazione degli oligo-elementi é il complemento indispensabile di ogni trattamento di cura.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento oligoterapico **MANGANESE-RAME**, nel caso di una diatesi ipo-reattiva, individuata molto presto, può realmente esercitare una vera prevenzione.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI IPO-REATTIVA

e) L'evoluzione diatesica

L'ipo-reattivo tende ad evolvere, raramente, verso la dis-reattività; tende ad evolvere, occasionalmente, verso l'a-reattività.

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE AEREE SUPERIORI

(nell'infanzia) - (1 di 7)

Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE-RAME:

1 dose 3 v./sett. [gg. disp.]

(per 3-4 mesi)

É opportuno iniziare questo tipo di trattamento con almeno 2-3 mesi di anticipo, rispetto al periodo previsto della fase acuta; avendo cura di ripeterlo per almeno 3-4 anni consecutivi)

Settembre – Dicembre e, poi, ½ Febbraio – Aprile

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

***INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE
AEREE SUPERIORI
(nell'infanzia) - (2 di 7)***

Qualora vi sia tendenza a
complicanze ORL associare:

RAME-ORO-ARGENTO:

1 dose 1-2 v./sett. [gg. pari]

(per 3-4 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE AEREE SUPERIORI (nell'infanzia) - (3 di 7)

**Trattamento oligo-terapico
complementare del trattamento oligo-
terapico diatesico**

ZOLFO: 1 dose 3 v./settimana [gg. disp.]

**5' dopo l'assunzione di
MANGANESE-RAME (per 3-4 mesi)**

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE AEREE SUPERIORI

(nell'infanzia) - (4 di 7)

**Trattamento oligo-terapico della fase
acuta**

MANGANESE-RAME: 1 dose 3 v./sett.

[gg. disp.],

+

RAME-ORO-ARGENTO: 1 dose 3. v./sett.

[gg. pari]

fino a persistenza della fase acuta

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE AEREE SUPERIORI

(nell'infanzia) - (5 di 7)

Trattamento oligo-terapico

complementare della fase acuta

RAME: 1 dose 1- 6 v./dì

(per un massimo di 10 giorni)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE AEREE SUPERIORI

(nell'infanzia) - (6 di 7)

Trattamento oligo-terapico

In presenza di complicanze ORL:

RAME-ORO-ARGENTO: 1 dose 1-2 v./dì

+

BISMUTO: 1 dose 1-2 v./dì

(per un massimo di 10 giorni).

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE AEREE SUPERIORI

(nell'infanzia) - (7 di 7)

**Trattamento oligo-terapico della fase
di convalescenza**

**MANGANESE-RAME: 1 dose 1-3
v./sett. [gg. disp.]**

+

**RAME-ORO-ARGENTO: 1 dose 1-3
v./sett. [gg. pari]
(per 1-2 mesi)**

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE AEREE SUPERIORI (nell'adulto) - (1 di 3)

Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE-RAME:

1 dose 2-3 v./sett. [gg. disp.]

+

RAME-ORO-ARGENTO:

1 dose 2-3 v./sett. [gg. pari]

(per 2-3 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE AEREE SUPERIORI (nell'adulto) - (2 di 3)

**Trattamento oligo-terapico
complementare (del trattamento
oligo-terapico diatesico)**

**ZOLFO: 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] ,
5' dopo l'assunzione di
MANGANESE-RAME (per 2-3 mesi)**

***INFEZIONI RECIDIVANTI DELLE VIE
AEREE SUPERIORI***

(nell'adulto) - (1 di 3)

**Trattamento oligo-terapico della fase
acuta**

MANGANESE-RAME:

1 dose 3 v./sett. [gg. disp.]

fino a persistenza della fase acuta

+

RAME-ORO-ARGENTO:

1 dose 3 v./settimana [gg. pari]

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

BRONCHITE ASMATICA - (1 di 2)

Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE-RAME:

1 dose 3 v./settimana [gg. disp.]

+

ZOLFO:

1 dose 3 v./settimana [gg. disp.]

5' dopo l'assunzione di

MANGANESE-RAME

(per 3-4 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

BRONCHITE ASMATICA - (2 di 2)

Trattamento oligo-terapico complementare

**In presenza di broncospasmo
associare:**

FOSFORO:

1 dose fino a 3-4 v./settimana

preferibilmente la sera.

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

BRONCHITE CRONICA - (1 di 3)

Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE-RAME:

1 dose 3 v./sett. [gg. disp.]

+

ZOLFO:

1 dose 3 v./sett. [gg. disp.],

5' dopo l'assunzione di **MANGANESE-RAME**

(per 4-6 mesi - cicli di 2 settimane/mese)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

BRONCHITE CRONICA - (2 di 3)

**Trattamento oligo-terapico
complementare al trattamento diatesico**

**Qualora vi sia compromissione dello
stato generale e/o insufficienza
respiratoria associare:**

RAME-ORO-ARGENTO:

1 dose 3 v./settimana [gg. pari]

(per 4-6 mesi - cicli di 2 settimane/mese)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

BRONCHITE CRONICA - (3 di 3)

Trattamento oligo-terapico complementare (al trattamento diatesico)

**In presenza di manifestazioni febbrili
e/o flogistiche associare:**

RAME:

**1 dose 1-6 v./dì (per un massimo
di 10 giorni)**

L'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA COME FORMA DI SOSTEGNO ALLA PERSONA

Ci vediamo il Giovedì 8 Novembre.

**Grazie per la vostra attenzione
e per aver resistito ad un fumante
piatto di pasta al pomodoro!!!**

