

Wilmer Zanghirati Urbanaz

**OLIGOTERAPIA
CATALITICA
E DIATESICA**




**DALLO STUDIO
DELLA PERSONA
ALLA CURA
DEL SUO TERRENO**



«É più importante sapere che tipo di persona ha una malattia che non sapere che tipo di malattia ha una persona»

Ippocrate





Wilmer Zanghirati Urbanaz

**OLIGOTERAPIA
CATALITICA
E DIATESICA**



LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA






Brevilineo stenico

Sanguigno

Sulfurico

Mesoblasta



Normolineo stenico/Longilineo astenico


Nervoso

Fosforico

Ectoblasta

Malinconico

Fluorico



Longilineo stenico

Bilioso

Muriatico

Cordoblasta




Brevilineo astenico

Flegmatico


Carbonico

Endoblasta

LE DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E LE COSTITUZIONI SECONDO IL MODELLO EMBRIOLOGICO



LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA



LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

AMBITO
FUNZIONALE

AMBITO
LESIONALE

○
DEGENERAT.

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-genitale
(maschile e
femminile)**

*Sviluppo sessuale
Meno e andro-pausa
Indiffer. e impot.
sessuale*

Zn-Cu

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-pancreatica
(pancreas
endocrino)**

*Metabolismo
glucidico
Diabete e pre-diabete*

Zn-Ni-Co

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-pancreatica
(pancreas esocrino)**

*Digestione dei grassi
Fermentazione
intestinale*

Ni-Co

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO O SINDROMI ENDOCRINE

SINDROME DA DISADATTAMENTO

IPOFISO-GENITALE

(ZINCO-RAME)

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO
O SINDROMI ENDOCRINE**

SINDROME DA DISADATTAMENTO

IPOFISO-GENITALE

(ZINCO-RAME)


Reattività agli stimoli esterni:

VARIABILE

Giornata:

A FASI ALTERNE: (SENZA PARTICOLARE ORDINE”)

LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA



LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

AMBITO
FUNZIONALE

AMBITO
LESIONALE

○
DEGENERAT.

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-genitale
(maschile e
femminile)**

*Sviluppo sessuale
Meno e andro-pausa
Indiffer. e impot.
sessuale*

Zn-Cu

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-pancreatica
(pancreas
endocrino)**

*Metabolismo
glucidico
Diabete e pre-diabete*

Zn-Ni-Co

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-pancreatica
(pancreas esocrino)**

*Digestione dei grassi
Fermentazione
intestinale*

Ni-Co

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

**LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO
O SINDROMI ENDOCRINE**

SINDROME DA DISADATTAMENTO

IPOFISO-PANCREATICA ENDOCRINA

(ZINCO-NICHEL-COBALTO)

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO
O SINDROMI ENDOCRINE**

SINDROME DA DISADATTAMENTO

IPOFISO-PANCREATICA ENDOCRINA

(ZINCO-NICHEL-COBALTO)


Reattività agli stimoli esterni:

VARIABILE

Giornata:

**A FASI ALTERNE: (PEGGIO IL MATTINO,
MEGLIO IL POMERIGGIO, PEGGIO LA SERA)**

LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA



LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

AMBITO
FUNZIONALE

AMBITO
LESIONALE

○
DEGENERAT.

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-genitale
(maschile e
femminile)**

*Sviluppo sessuale
Meno e andro-pausa
Indiffer. e impot.
sessuale*

Zn-Cu

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-pancreatica
(pancreas
endocrino)**

*Metabolismo
glucidico
Diabete e pre-diabete*

Zn-Ni-Co

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-pancreatica
(pancreas esocrino)**

*Digestione dei grassi
Fermentazione
intestinale*

Ni-Co

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO
O SINDROMI ENDOCRINE**

SINDROME DA DISADATTAMENTO

IPOFISO-PANCREATICA ESOCRINA

(NICHEL-COBALTO)

Reattività agli stimoli esterni:

VARIABILE

Giornata:

CORRELATA ALLA DIATESI DEL SOGGETTO

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

**LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO
O SINDROMI ENDOCRINE**

SINDROME DA DISADATTAMENTO

IPOFISO-PANCREATICA ESOCRINA

(NICHEL-COBALTO)

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO O SINDROMI ENDOCRINE

Le sindromi da disadattamento, denominate, anche, "diatesi parassite", oppure "quinta diatesi" si inseriscono sulle altre diatesi: sulla diatesi iper-reattiva, sulla diatesi ipo-reattiva e sulla diatesi dis-reattiva, talvolta anche sulla diatesi a-reattiva;

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO O SINDROMI ENDOCRINE

aggiungendo, alla sintomatologia diatesica, delle manifestazioni funzionali di tipo endocrino e, particolarmente, ipofisario.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO O SINDROMI ENDOCRINE

Sono l'espressione di un'astenia capricciosa, periodica, anche con peggioramento delle funzioni intellettuali.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO O SINDROMI ENDOCRINE

Le sindromi da disadattamento si possono esprimere sotto tre diverse forme:

- 1) SINDROME DA DISADATTAMENTO IPOFISOGENITALE (femminile o maschile)**
- 2) SINDROME DA DISADATTAMENTO IPOFISOPANCREATICA ENDOCRINA,**
- 3) SINDROME DA DISADATTAMENTO IPOFISOPANCREATICA ESOCRINA.**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO O SINDROMI ENDOCRINE

a) Il comportamento

Le sindromi da disadattamento sono caratterizzate anche dalla periodicità con la quale si possono manifestare, ma anche dal fatto che possono “inquinare” il terreno diatesico per periodi anche molto lunghi (anche di diversi anni).

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO O SINDROMI ENDOCRINE

a) Il comportamento

Le sindromi da disadattamento si possono manifestare anche con delle crisi di stanchezza ("*coups de pompe*") che possono avere orari ricorrenti, oppure senza orario particolare;

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO O SINDROMI ENDOCRINE

a) Il comportamento


questa astenia ciclica, che si presenta, di frequente, con una violenta fame da lupi può essere migliorata dall'associazione oligoterapica **ZINCO-NICHEL-COBALTO.**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO O SINDROMI ENDOCRINE

a) Il comportamento

Sotto l'aspetto mentale, si possono osservare, nella sindrome da disadattamento, anche delle situazioni di depressione mentale, dei "vuoti" di tutte le capacità intellettuali, ma, sempre, in modo temporaneo.

LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA



LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

AMBITO
FUNZIONALE

AMBITO
LESIONALE

○
DEGENERAT.

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-genitale
(maschile e
femminile)**

*Sviluppo sessuale
Meno e andro-pausa
Indiffer. e impot.
sessuale*

Zn-Cu

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-pancreatica
(pancreas
endocrino)**

*Metabolismo
glucidico
Diabete e pre-diabete*

Zn-Ni-Co

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-pancreatica
(pancreas esocrino)**

*Digestione dei grassi
Fermentazione
intestinale*

Ni-Co

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO
O SINDROMI ENDOCRINE**

SINDROME DA DISADATTAMENTO

IPOFISO-GENITALE

(ZINCO-RAME)

Reattività agli stimoli esterni:

VARIABILE

Giornata:

A FASI ALTERNE: (SENZA PARTICOLARE “ORDINE”)

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
*SINDROME DA DISADATTAMENTO IPOFISO-
GENITALE*
ZINCO-RAME**

**b) I sintomi e le predisposizioni morbose
Difficoltà di adattamento delle ghiandole
endocrine agli stimoli ipofisari e di cui la fase
conclusiva é a livello genitale:**

- non corretto funzionamento endo-
crino; in particolare gli stati ipofiso-
genitali ed ipofiso-surrenali;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
SINDROME DA DISADATTAMENTO IPOFISO-
GENITALE
ZINCO-RAME

b) I sintomi e le predisposizioni morbose
Difficoltà di adattamento delle ghiandole
endocrine agli stimoli ipofisari e di cui la fase
conclusiva é a livello genitale:

- indifferenza ed impotenza**
sessuale, qualora si tratti di turbe
funzionali;

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
*SINDROME DA DISADATTAMENTO IPOFISO-
GENITALE*
ZINCO-RAME**

**b) I sintomi e le predisposizioni morbose
Difficoltà di adattamento delle ghiandole
endocrine agli stimoli ipofisari e di cui la fase
conclusiva é a livello genitale:**

- trattamento di alcune forme di
impotenza (in associazione con gli
oligoelementi
ZINCO-NICHEL-COBALTO);**

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
*SINDROME DA DISADATTAMENTO IPOFISO-
GENITALE*
ZINCO-RAME**

**b) I sintomi e le predisposizioni
morbose**

- turbe mestruali e della funzionalità ovarica;**
- disequilibrio dell'asse ipotalamo-ipofisi-surrenali in seguito a stress emozionali;**

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
*SINDROME DA DISADATTAMENTO IPOFISO-
GENITALE*
ZINCO-RAME**

**b) I sintomi e le predisposizioni
morbose**


- sindromi prostatiche funzionali in fase precoce;**
- sindrome adiposo-genitale;**
- criptorchidismo;**
- ritardi della crescita e dello sviluppo su base ormonale;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
SINDROME DA DISADATTAMENTO IPOFISO-
GENITALE
ZINCO-RAME

**b) I sintomi e le predisposizioni
morbose**

- enuresi infantile;**
- forme psoriasiche (in associazione
con l'associazione **ZINCO-NICHEL-**
COBALTO e ZOLFO).**

LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA



LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

AMBITO
FUNZIONALE

AMBITO
LESIONALE

○
DEGENERAT.

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-genitale
(maschile e
femminile)**

*Sviluppo sessuale
Meno e andro-pausa
Indiffer. e impot.
sessuale*

Zn-Cu

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-pancreatica
(pancreas
endocrino)**

*Metabolismo
glucidico
Diabete e pre-diabete*

Zn-Ni-Co

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-pancreatica
(pancreas esocrino)**

*Digestione dei grassi
Fermentazione
intestinale*

Ni-Co

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO
O SINDROMI ENDOCRINE**

SINDROME DA DISADATTAMENTO

IPOFISO-PANCREATICA ENDOCRINA

(ZINCO-NICHEL-COBALTO)

Reattività agli stimoli esterni:

VARIABILE

Giornata:

**A FASI ALTERNE: (PEGGIO IL MATTINO,
PEGGIO IL POMERIGGIO)**

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
*SINDROME DA DISADATTAMENTO IPOFISO-
PANCREATICA ENDOCRINA*
ZINCO-NICHEL-COBALTO**

**b) I sintomi e le predisposizioni
morbose**

**Questa forma di disadattamento, che
si riscontra con una certa frequenza,
é caratterizzata da una sintomato-
logia legata ad una cattiva
regolazione della glicemia:**

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
*SINDROME DA DISADATTAMENTO IPOFISO-
PANCREATICA ENDOCRINA*
ZINCO-NICHEL-COBALTO**

**b) I sintomi e le predisposizioni
morbose**

- non corretto funzionamento
ipofiso-pancreatico;**
- astenia pre-prandiale con tremori
ed ansia;**
- astenia ciclica**
- atteggiamento ciclotimico;**

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
*SINDROME DA DISADATTAMENTO IPOFISO-
PANCREATICA ENDOCRINA*
ZINCO-NICHEL-COBALTO**

**b) I sintomi e le predisposizioni
morbose**

- stati di prediabete e turbe del metabolismo glucidico (iper- e ipo-);
- diabete;
- fame improvvisa, e crisi lipotimiche;
- obesità endocrina per eccesso di produzione di insulina;

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
*SINDROME DA DISADATTAMENTO IPOFISO-
PANCREATICA ENDOCRINA*
ZINCO-NICHEL-COBALTO**


**b) I sintomi e le predisposizioni
morbose**

- difficoltà di concentrazione,
sensazione di vacuità cerebrale;**
- sonnolenza e/o astenia post-
prandiale;**
- pancreatiti;**

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
*SINDROME DA DISADATTAMENTO IPOFISO-
PANCREATICA ENDOCRINA*
ZINCO-NICHEL-COBALTO**

- b) I sintomi e le predisposizioni morbose**
- psoriasi (in associazione con l'associazione oligoterapica **ZINCO-RAME** e l'elemento **ZOLFO**);**
 - trattamento di alcune forme di impotenza (in associazione oligoterapica **ZINCO-RAME**).**

LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA



LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

AMBITO
FUNZIONALE

AMBITO
LESIONALE

○
DEGENERAT.

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-genitale
(maschile e
femminile)**

*Sviluppo sessuale
Meno e andro-pausa
Indiffer. e impot.
sessuale*

Zn-Cu

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-pancreatica
(pancreas
endocrino)**

*Metabolismo
glucidico
Diabete e pre-diabete*

Zn-Ni-Co

SINDROME DA DISADATTAMENTO

**Ipofiso-pancreatica
(pancreas esocrino)**

*Digestione dei grassi
Fermentazione
intestinale*

Ni-Co

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO
O SINDROMI ENDOCRINE**

SINDROME DA DISADATTAMENTO

IPOFISO-PANCREATICA ESOCRINA

(NICHEL-COBALTO)

Reattività agli stimoli esterni:

VARIABILE

Giornata:

CORRELATA ALLA DIATESI DEL SOGGETTO

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
SINDROME DA DISADATTAMENTO
IPOFISO-PANCREATICA ESOCRINA
NICHEL-COBALTO**

**b) I sintomi e le predisposizioni
morbose**

**Questa forma di disadattamento
presenta una sintomatologia e delle
predisposizioni morbose, chiaramente,
riferibili a turbe del pancreas
esocrino:**

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
SINDROME DA DISADATTAMENTO
IPOFISO-PANCREATICA ESOCRINA
NICHEL-COBALTO**

**b) I sintomi e le predisposizioni
morbose**

- difficoltà di digestione dei grassi;**
- fermentazione intestinale e meteo-
rismo;**
- feci grasse – steatorrea;**
- alcuni casi di stipsi;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA SINDROME DA DISADATTAMENTO IPOFISO-PANCREATICA ESOCRINA NICHEL-COBALTO

**b) I sintomi e le predisposizioni
morbose**

- esofagia;**
- sonnolenza postprandiale;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA ***LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO*** ***O SINDROMI ENDOCRINE***

**c) L'approccio al trattamento
oligoterapico**

**Una sindrome da disadattamento,
spesso, è così imponente da
mascherare la sintomatologia
diatesica;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO
O SINDROMI ENDOCRINE

**c) L'approccio al trattamento
oligoterapico**

**in tal caso si tratterà, inizialmente,
l'aspetto relativo alla sindrome da
disadattamento, fino a far emergere i
sintomi e le predisposizioni morbose
diatesiche specifiche, dopo di che,
verrà trattata la diatesi vera e propria.**

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
*LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO
O SINDROMI ENDOCRINE***

**c) L'approccio al trattamento
oligoterapico**

**Negli altri casi, il trattamento oligo-
terapico di una sindrome da
disadattamento dovrà, sempre,
essere associato al trattamento
oligo-terapico della diatesi di
appartenenza dell'individuo.**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO
O SINDROMI ENDOCRINE

**d) L'approccio al trattamento
oligoterapico**

**L'associazione oligoterapica **ZINCO-
RAME** é indicato per regolarizzare le
disfunzioni caratteristiche della
sindrome da disadattamento ipofiso-
genitale.**

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
*LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO
O SINDROMI ENDOCRINE***

**d) L'approccio al trattamento
oligoterapico**

**L'assunzione dell'associazione oligo-
terapica **ZINCO-RAME** é contro-
indicata nella TBC evolutiva e nel
cancro dichiarato.**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO
O SINDROMI ENDOCRINE

d) L'approccio al trattamento
oligoterapico

L'associazione oligoterapica **ZINCO-NICHEL-COBALTO** é indicata per regolarizzare le disfunzioni caratteristiche della sindrome da disadattamento ipofiso-pancreatica endocrina.

**OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA
*LE SINDROMI DA DISADATTAMENTO
O SINDROMI ENDOCRINE***

**d) L'approccio al trattamento
oligoterapico**

**L'associazione oligoterapica
NICHEL-COBALTO é indicata per
regolarizzare le disfunzioni caratte-
ristiche della sindrome da disadatta-
mento ipofiso-pancreatica esocrina.**

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

ALTERAZIONI DEL CICLO MESTRUALE IN SOGGETTI IPER-REATTIVI

(dolori mestruali, frequenza, flusso)

Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE: 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] (per 3 mesi)

+

ZINCO-RAME: 1 dose 3 v./sett. [gg. pari] (per 3 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

ALTERAZIONI DEL CICLO MESTRUALE IN SOGGETTI IPO-REATTIVI

(dolori mestruali, frequenza, flusso,

vampate di calore, pre-climaterio, climaterio, alterazioni
del tono dell'umore)

Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE-RAME: 1 dose 3 v./sett. [gg. dispari] (per
3 , o più, mesi)

+

ZINCO-RAME: 1 dose 3 v./sett. [gg. pari] (per
3 , o più, mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

ALTERAZIONI DEL CICLO MESTRUALE IN SOGGETTI DIS-REATTIVI

**(dolori mestruali, frequenza, flusso, vampate di calore,
pre-climaterio, climaterio, alterazioni del tono dell'umore)**

Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE-COBALTO: 1 dose 3 v./sett. [gg. dispari]
(per 3, o più, mesi)

+

ZINCO-RAME: 1 dose 3 v./sett. [gg. pari] (per
3 , o più, mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

CELLULITE

Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE-COBALTO: 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.]
(per 2-3 mesi)

+

ZINCO-NICHEL-COBALTO: 1 dose 3 v./sett. [gg. pari]
(per 2-3 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

CELLULITE

Trattamento oligo-terapico complementare

ZOLFO: 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] 5' dopo
l'assunzione di **MANGANESE-COBAL-
TO** (per 2-3 mesi)

In presenza di ritenzione idrica associare:

POTASSIO: 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] 5' dopo
l'assunzione di **ZINCO – NICHEL-CO-
BALTO** (per 2-3 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

SINDROME METABOLICA IN SOGGETTI NORMO-TESI

Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE-COBALTO: 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.]
(per 4-6 mesi)

+

ZINCO-NICHEL-COBALTO: 1 dose 3 v./sett. [gg. pari]
(per 4-6 mesi)

Trattamento oligo-terapico complementare

ZOLFO: 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.]
5' dopo l'assunzione di
MANGANESE-COBALTO
(per 4-6 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO *SINDROME METABOLICA* *IN SOGGETTI IPER-TESI*

Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE: 1 dose 2 v./settimana [Lun. e Gio.] (per 4-6 mesi)

+

IODIO: 1 dose 2 v./settimana [Lun. e Gio.], 5' dopo l'assunzione di MANGANESE (per 4-6 mesi)

e

COBALTO: 1 dose 2 v./settimana [Mar. e Ven.] (per 4-6 mesi)

+

ZOLFO: 1 dose 2 v./settimana [Mar. e Ven.] 5' dopo l'assunzione di **COBALTO** (per 4-6 mesi)

+++ (continua)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

SINDROME METABOLICA IN SOGGETTI IPER-TESI

Trattamento oligo-terapico diatesico

(segue)

ZINCO-NICHEL-COBALTO: 1 dose 3 v./sett. [Mer., Sab.
e Dom.] (per 4-6 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

FORME DI FERMENTAZIONE INTESTINALE IN PRESENZA DI FECI "GRASSE" E METEORISMO

NICHEL-COBALTO: 1 dose 2-3 v./sett. [gg. dispari]
(per 2-3 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

***DIFFICOLTÀ DI DIGESTIONE DEI GRASSI, ANCHE IN
PRESENZA DI SONNOLENZA POST PRANDIALE***

NICHEL-COBALTO: 1 dose 2-3 v./sett. [gg. dispari]
(per 2-3 mesi)

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Apparato riproduttore femminile

	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Ciclo mestruale ravvicinato - intenso - doloroso	X				X		
Ciclo mestruale distanziato - scarso		X			X		
Ciclo mestruale irregolare	X		XX		X		
Ciclo mestruale assente		X	X	XX	X		
Turbe della menopausa			X		X		
Sterilità	XX				X		
Frigidità - Disinteresse ai rapporti sessuali					X	X	

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Apparato riproduttore maschile	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Astenia sessuale - Disinteresse ai rapporti sessuali	X		X		X	X	
Impotenza sessuale		X		X	X	X	
Ipertrofia prostatica			X	X	X		

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Sistema endocrino - Pancreas	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Feci non digerite	X		XX				Ni-Co
Diarree putride	X		XX				Ni-Co
Dimagrimento	X		XX			X	
“Coup de pompe” (stanchezza improvvisa)	X		XX			X	
Forme di “smania” a metà mattino e/o pomeriggio	X		XX			X	

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Surrenali	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Astenia	X	X		X	X		
Ipotensione arteriosa	X	X		X	X		
Depressione nervosa	X	X		X	X		
Sonnolenza	X	X		X	X		
Diarree	X	X		X	X		
Vomito	X	X		X	X		

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Tiroide Iper/Ipo-tiroidismo	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	Al
Ipertensione arteriosa (in persona iper-tiroidea)	X		X		X		I
Variazione ponderale (in persona iper-tiroidea)	X		X		X		I
Vampate di calore (in persona iper-tiroidea)	X		X		X		I
Nervosismo (in persona iper-tiroidea)	X		X		X		I
Palpitazioni (in persona iper-tiroidea)	X		X		X		I
Diarree (in persona iper-tiroidea)	X		X		X		I
Ipotensione arteriosa (in persona ipo-tiroidea)		X			X		I
Rallentamento dei riflessi (in persona ipo-tiroidea)		X			X		I
Apatia (in persona ipo-tiroidea)		X			X		I
“Freddolosità” (in persona ipo-tiroidea)		X			X		I
Stipsi (in persona ipo-tiroidea)		X			X		I

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Testa	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Cefalee - Eemicranie	X		X			X	
Problemi a carico dell'udito			X				
Vertigini (dovute a cadute di pressione - Sincope)			X				
Vertigini (dovute a pressione bassa - Sincope)		X		X			

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Apparato urinario	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Minzione frequente o rara			X			X	
Cistite		X		XX			
Enuresi	X	X			X		
Incontinenza			X	XX			F
Nicturia	X		XX				I

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Apparato digerente	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Appetito irregolare		X				X	
Appetito scarso		X					
Intolleranze alimentari	X		X			X	
Nausee	X	XX				X	
Digestione lenta e “laboriosa”			X				Ni-Co
Coliche		X		XX			
Gas intestinale - Meteorismo - Flatulenza - Aerofagia	X		X				Ni-Co
Peritonite				XX			
Gastrite - Duodenite	X		XX				
Ulcera gastrica			XX				
Enterocolite cronica		X		XX			
Colite - Rettocolite - Colite sigmoide		X		XX			
Stipsi	X		X				I
Diarrea		XX					I
Stipsi e diarrea alternate	X		X				
Feci non digerite	X		XX				Ni-Co
Diarree putride	X		XX				Ni-Co

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

Pelle e annessi cutanei

	Mn	Mn Cu	Mn Co	Cu Au Ag	Zn Cu	Zn Ni Co	
Acne giovanile	X	X		X	X		
Eczema non infetto	X	X	X	X			S
Eczema infetto		X		X			S
Prurito - Orticaria	X		X				S
Edema di Quincke	X		X				S
Fragilità di unghie e capelli	X		X	X	X		S
Caduta dei capelli	X		X	X	X		S

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

**«COMPAGNA» DELLA
VOSTRA QUOTIDIANA
PROFESSIONE**

