

Wilmer Zanghirati Urbanaz

**OLIGOTERAPIA
CATALITICA
E DIATESICA**




**DALLO STUDIO
DELLA PERSONA
ALLA CURA
DEL SUO TERRENO**



«É più importante sapere che tipo di persona ha una malattia che non sapere che tipo di malattia ha una persona»

Ippocrate





Wilmer Zanghirati Urbanaz

**OLIGOTERAPIA
CATALITICA
E DIATESICA**



LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA






Brevilineo stenico

Sanguigno

Sulfurico

Mesoblasta



Normolineo stenico/Longilineo astenico


Nervoso

Malinconico

Fosforico

Fluorico

Ectoblasta



Longilineo stenico

Bilioso

Muriatico

Cordoblasta




Brevilineo astenico

Flegmatico


Carbonico

Endoblasta

LE DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E LE COSTITUZIONI SECONDO IL MODELLO EMBRIOLOGICO



LE DIFFERENTI DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

III DIATESI

DIS-REATTIVA

distonica
neuro-artritica

Oligoelementi:
MANGANESE-COBALTO

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

III DIATESI

DIS-REATTIVA

Oligoelementi: MANGANESE-COBALTO

Reattività agli stimoli esterni:

DIS-REATTIVITÀ

Giornata:

A FASI ALTERNE

(PEGGIO IL MATTINO

MEGLIO IL POMERIGGIO

PEGGIO LA SERA)

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

III DIATESI *DIS-REATTIVA* (MANGANESE-COBALTO)

ASPETTI COSTITUZIONALI PREVALENTI

Medicina omeopatica:

Fluorica, Fosforica, Sulfurica

Costituzionale sec. Ippocrate

Malinconica, Nervosa, Sanguigna

Embriologica sec. Martiny:

Ectoblasta, Mesoblasta



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

La diatesi dis-reattiva é una variante ed un'evoluzione del terreno iperreattivo (I diatesi) verso un calo di vitalità e verso la senescenza.

É una diatesi degli adulti, un tempo chiamata "diatesi della cinquantina".

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

Il termine di “neuro-artritismo” che veniva attribuito a questa diatesi indica, in maniera appropriata, la partecipazione neuro-vegetativa.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

La diatesi dis-reattiva corrisponde al terreno spasmofilico con diverse manifestazioni di:

- instabilità emotiva;**
- instabilità cardiocircolatoria;**
- instabilità delle funzioni gastro-intestinali.**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

Generalmente, questo fatto, significa l'apparizione di turbe neuro-vegetative, circolatorie ed eliminatorie.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

La diatesi dis-reattiva, inizialmente, é funzionale, per, poi, evolvere verso il patologico ed il lesionale e si avvicina ai limiti di regolazione dei catalizzatori.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

É, importante riconoscere la diatesi dis-reattiva il più presto possibile, al fine di impostare la terapia per prevenire i danni organici ed il processo degenerativo.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

a) Il comportamento

Il dis-reattivo é un individuo dallo spirito creativo, psicologicamente instabile, nervoso, emotivo, frequentemente apparentemente “depresso” o malinconico, ma egli é, prima di tutto, e soprattutto, un ansioso: la dis-tonia si esprime nella “diatesi dell'ansia”.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

a) Il comportamento per cui, il dis-reattivo, spesso e volentieri, si rifugia nel “tranquillante”.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

a) Il comportamento

Il soggetto dis-reattivo convive con una sensazione di invecchiamento, che si contrappone ad un passato tonico ed ottimista.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

a) Il comportamento

L'evoluzione di questa diatesi é caratterizzata da un invecchiamento generale delle più diverse manifestazioni psichiche e fisiche: l'asma, ad esempio, si trasforma in enfisema.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

a) Il comportamento

Nel soggetto dis-reattivo, la memoria e la capacità di concentrazione sono, pure, in netta diminuzione, perfino al punto di scomparire.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

a) Il comportamento

Morfologicamente, non é improbabile incontrare soggetti dis-reattivi che presentino: pelle calda, umida e rossa, una costituzione anche molto muscolosa, larga dall'alto, con testa larga e piena che, qualora in sovrappeso, tendono ad essere degli obesi "sodi".

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

b) Il sonno

La dis-reattività può portare ad un progressivo aumento della stanchezza nel corso della giornata, particolarmente nelle ore successive al pasto del mezzogiorno, talvolta, con torpore post-prandiale (più marcata alle membra inferiori),

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

**b) Il sonno
spesso si é in presenza di
addormentamento serotino “davanti
al televisore”, oppure di difficoltà a
prendere sonno.**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

b) Il sonno

Il sonno del dis-reattivo diviene mediocre, accompagnato da più o meno frequenti risvegli notturni e non è ristoratore.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

b) Il sonno

Il risveglio mattutino del dis–reattivo può essere “laborioso”, una sensazione di necessità di dormire ancora e di stanchezza può accompagnare il risveglio.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

b) Il sonno

La sensazione di affaticamento, può essere accompagnata, talvolta, da obnubilamento e scompare lentamente con l'inizio dell'attività e degli impegni di lavoro.


OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA


b) Il sonno

La giornata del dis–reattivo é accompagnata, frequentemente, da manifestazioni di origine neurovegetativa.

APPROCCIO OLIGOTERAPICO ALL'INSONNIA



LE DIATESI NELL'OLIGOTERAPIA CATALITICA E LE COSTITUZIONI SECONDO IL MODELLO EMBRIOLOGICO



OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

- turbe psichiche con ansia;**
- angoscia, con disturbi cardiaci;**
- crisi di panico;**
- manifestazioni simil-anginose;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

**c) I sintomi e le predisposizioni
morbose**

**distonie vago-simpatice in generale
turbe a carico dell'apparato
circolatorio, come:**

- emorroidi;**
- varici;**
- eczemi varicosi;**
- flebite;**
- congestioni pelviche;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

**c) I sintomi e le predisposizioni
morbose**

**distonie vago-simpatiche in generale
turbe a carico dell'apparato
circolatorio, come:**

- alterazione della pressione
arteriosa;**
- crampi, soprattutto notturni, ai
polpacci;**
- parestesie alle estremità;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

**c) I sintomi e le predisposizioni
morbose**

**distonie vago-simpatice in generale
turbe a carico dell'apparato
circolatorio, come:**

- edemi ed arteriti delle membra inferiori;**
- copparosa;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

- c) I sintomi e le predisposizioni morbose**
- distonie vago-simpatiche in generale**
- turbe a carico dell'apparato circolatorio, come:**
- iper-tensione spasmodica (sistolica); arteriosclerosi;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

- c) I sintomi e le predisposizioni morbose**
- distonie vago-simpatiche in generale**
- turbe a carico dell'apparato circolatorio, come:**
- pseudoprecordialgie, ma, anche angina pectoris**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

**c) I sintomi e le predisposizioni
morbose**

**distonie vago-simpatiche in generale
turbe a carico dell'apparato
circolatorio, come:**

- altre malattie cardio vascolari di tipo lesionale, come:**
- infarti;**
- coronaropatie;**
- aortiti;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

- asma cardiaca;**
- algie circolatorie;**
- cefalee occipitali (di origine vasomotoria);**
- nevriti prevalentemente occipitali e nucali, con mialgie associate;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

**c) I sintomi e le predisposizioni
morbose**

turbe digestive, come:

- ulcera gastrica;**
- digestione lenta e difficile;**
- gastralgie pre-prandiali;**
- infiammazione duodenale;**
- spasmi colitici;**
- spasmi simpaticotonici epigastrici;**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

- difficoltà di eliminazione (oliguria);
- litiasi e calcoli renali;
- cistiti;
- nefrite cronica;
- gotta;

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

- **obesità “soda”;**
- **reazioni cutanee del tipo "edema di Quincke";**
- **eczemi ed orticaria cronici;**
- **forme artrosiche, anche in presenza di dolori periodici;**
- **turbe simili a quelle della menopausa.**

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

c) I sintomi e le predisposizioni morbose

Questa diatesi é, quindi, dominata dalle dis-tonie e dalle reazioni verso un invecchiamento precoce, i cui segnali d'allarme sono, nettamente neurovegetativi e circolatori.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento oligoterapico

Nella pratica professionale, alcuni disturbi, come ad esempio l'emicrania, si riequilibra con l'oligoelemento **MANGANESE**, prima dei 20-30 anni, e con l'associazione oligoterapica **MANGANESE-COBALTO**, dopo tale età.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento oligoterapico

L'azione dell'associazione oligoterapica **MANGANESE-COBALTO**, in questa diatesi, é determinante;

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento oligoterapico é, altresì, vantaggiosa, se non indispensabile, l'associazione con l'elemento **ZOLFO**, poiché si é, frequentemente, in presenza di un deficit funzionale epatico.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento oligoterapico

Si consiglia l'assunzione dell'elemento **ZOLFO**, almeno 5' dopo quella dell'associazione oligoterapica **MANGANESE-COBALTO**.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento oligoterapico

Si rivela utile, pure, la somministrazione dell'oligoelemento **IODIO**, qualora si sia in presenza di problemi tiroidei, sia in senso ipo-, che in senso iper-.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento oligoterapico

Può essere vantaggioso, anche, l'utilizzo dell'elemento **MAGNESIO**, soprattutto in presenza di algie artrosiche.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

d) L'approccio al trattamento oligoterapico

Ulteriori somministrazioni dell'oligo-elemento **COBALTO**, da solo, possono essere giustificate se prevale la patologia circolatoria, ovvero la componente spastica.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

d) In questa diatesi, l'azione degli oligo-elementi rimane limitata allo aspetto funzionale dei sintomi e delle predisposizioni morbose, e non si indirizza, però, all'aspetto lesionale.

OLIGOTERAPIA CATALITICA E DIATESICA

DIATESI DIS-REATTIVA

e) L'evoluzione diatesica

Il soggetto dis-reattivo tende ad “evolvere”, tanto naturalmente in tempi lunghi, quanto accidentalmente in maniere rapida, verso l'a-reattività; può “regredire”, occasionalmente, verso l'iper-reattività.

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

TURBE DEL SONNO

Trattamento oligo-terapico diatesico

In presenza di euforia serotina e difficoltà a prendere sonno:

MANGANESE: 1 dose 2-3 v./settimana [gg. dispari] (per 3 mesi)

In presenza di insonnia con ansia serotina e risveglio notturno, nonché forme neuro-distoniche, come palpitazioni e dispnea sospirosa:

MANGANESE-COBALTO: 1 dose 3 v./settimana [gg. dispari] (per 3 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

TURBE DEL SONNO

Trattamento oligo-terapico complementare

In presenza di euforia serotina e difficoltà a prendere sonno associare:

ALLUMINIO: 1 dose/dì (per 1 settimana)
1 dose 3 v./settimana [gg. dispari]
(per 2-3 mesi)

In presenza di sindrome ansioso-depressiva associare:

LITIO: 1 dose 3-7 v./settimana (per 2-3 mesi)

In presenza di risvegli notturni e risveglio precoce in soggetto a-reattivo associare:

RAME-ORO-ARGENTO: 1 dose 3 v./settimana [gg. pari]
(per 2-3 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

PICCHI IPERTENSIVI *IN SOGGETTI IPER-REATTIVI* Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE: 1 dose 3 v./settimana [gg. pari] (per 3 mesi)

+

IODIO: 1 dose 3 v./settimana [gg. pari], 5' dopo l'assunzione di MANGANESE (per 3 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

PICCHI IPERTENSIVI

IN SOGGETTI IPER-REATTIVI di COSTITUZIONE

MESOBLASTA – SANGUIGNA - SULFURICA

Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE: 1 dose 3 v./settimana [gg. pari] (per 3 mesi)

+

IODIO: 1 dose 3 v./settimana [gg. pari], 5' dopo
l'assunzione di MANGANESE (per 3 mesi)

+

ZOLFO: 1 dose 3 v./settimana [gg. dispari], (per 3 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE IN SOGGETTI DIS-REATTIVI

Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE: 1 dose 3 v./settimana [gg. pari] (per 3 mesi)

+

IODIO: 1 dose 3 v./settimana [gg. pari], 5' dopo
l'assunzione di MANGANESE (per 3 mesi)

+

COBALTO: 1 dose 3 v./settimana [gg. disp.] (per 3 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE IN SOGGETTI DIS-REATTIVI

TRATTAMENTO DI MANIFESTAZIONI CORRELATE (ALL'IPERTENSIONE ARTERIOSA)

In presenza di sindromi ansioso-depressive associare:

LITIO: 1 dose 1-5 v/dì (al bisogno)

Nei soggetti dis-reattivi associare:

IODIO: 1 dose 1-3 v./settimana (per 3 mesi)

In presenza di "spasmofilia o iper-eccitabilità muscolare associare:

POTASSIO: 1 dose/dì (al bisogno)

+

MANGANESE: 1 dose/dì (al bisogno)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE IN SOGGETTI DIS-REATTIVI di COSTITUZIONE MESOBLASTA – SANGUIGNA - SULFURICA

Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE: 1 dose 3 v./settimana [gg. pari] (per 3 mesi)

+

IODIO: 1 dose 3 v./settimana [gg. pari], 5' dopo
l'assunzione di MANGANESE (per 3 mesi)

+

COBALTO: 1 dose 3 v./settimana [gg. disp.] (per 3 Mesi)

+

ZOLFO: 1 dose 3 v./settimana [gg. disp.], 5' dopo
l'assunzione di COBALTO (per 3 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE IN SOGGETTI DIS-REATTIVI

TRATTAMENTO DI MANIFESTAZIONI CORRELATE (ALL'IPERTENSIONE ARTERIOSA)

In presenza di sindromi ansioso-depressive associare:

LITIO: 1 dose 1-5 v/dì (al bisogno)

Nei soggetti dis-reattivi associare:

IODIO: 1 dose 1-3 v./settimana (per 3 mesi)

In presenza di "spasmofilia o iper-eccitabilità muscolare associare:

POTASSIO: 1 dose/dì (al bisogno)

+

MANGANESE: 1 dose/dì (al bisogno)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

ECZEMA ATOPICO

Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE: 1 dose/sett. (per 3 mesi)

In presenza di eczema cronico o impetiginizzato aggiungere

MANGANESE-RAME: 1 dose 3 v/sett. [gg. pari](per 3 mesi)

Trattamento oligo-terapico complementare

ZOLFO: 1 dose 3 v./settimana [gg. pari] ,
5' dopo l'assunzione di **MANGANESE**
(per 3 mesi)

In presenza di manifestazioni acute aggiungere

POTASSIO 1 dose/dì (al bisogno)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

ECZEMA IMPETIGINIZZATO

(con sovrapposizione batterica)

Trattamento oligo-terapico diatesico

RAME-ORO-ARGENTO: 1 dose 3 v./sett. [gg. disp.] (per
3 mesi)

+

MANGANESE-RAME: 1 dose 3 v./sett. [gg. pari] (per
3 mesi)

Trattamento oligo-terapico complementare

ZOLFO: 1 dose 3 v./settimana

5' dopo l'assunzione ad **MANGANESE-RAME** [gg. pari] (per 3
mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

ECZEMA TOPICO

(da contatto)

Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE-RAME: 1 dose 3 v./settimana [gg. disp.]
(per 3 mesi)

Trattamento oligo-terapico complementare

ZOLFO: 1 dose 3 v./settimana [gg. disp.]
5' dopo l'assunzione di
MANGANESE-RAME (per 3 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

ECZEMA VARICOSO

Trattamento oligo-terapico diatesico

MANGANESE-COBALTO: 1 dose 3 v./sett. [gg. dispari]
(per 3 mesi)

+

MANGANESE-RAME: 1 dose 3 v./sett. [gg. pari]
(per 3 mesi)

Trattamento oligo-terapico complementare

ZOLFO: 1 dose 3 v./sett. [gg. dispari] ,
5' dopo l'assunzione di
MANGANESE-COBALTO (per
3 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INSUFFICIENZA VENOSA DEGLI ARTI INFERIORI

**Trattamento oligo-terapico diatesico
(e preventivo in caso di gravidanza)**

MANGANESE-COBALTO 1 dose 3 v./settimana [gg.
dispari] (per 3-6 mesi)

APPROCCIO AL TRATTAMENTO OLIGOTERAPICO

INSUFFICIENZA VENOSA DEGLI ARTI INFERIORI

Trattamento oligo-terapico complementare

ZOLFO: 1 dose 3 v./sett. [gg. dispari] 5' dopo la
assunzione di **MANGANESE-COBALTO** (per
3 mesi).

Molto utile in presenza di eczema varicoso
e/o emorroidi.

+

FLUORO: 1 dose 2-3 v./settimana [gg. pari] (per 3-
6 mesi)

In presenza di crampi associare:

MAGNESIO: 1 dose 3 v./settimana (al bisogno)